

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/DCP/10/0006

**Fypryst** 50 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem

## 1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:  
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

## 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Fypryst** 50 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem  
*Fipronil*

## 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena pipete (0,5 ml) satur:

### Aktīvā viela:

Fipronils 50 mg

### Palīgvielas:

Butilhidroksianizols (E320) 0,10 mg

Butilhidroksitoluols (E321) 0,05 mg

## 4. INDIKĀCIJA(-S)

Blusu (*Ctenocephalides felis*) un ērcu (*Rhipicephalus* sugas, *Dermacentor* sugas, *Ixodes* sugas) invāzijas ārstēšana un profilakse kaķiem.

Alerģijas pret blusu kodumiem ārstēšana un kontrole kaķiem (blusu kodumu alerģijas).

Utu (*Felicola subrostratus*) invāzijas profilakse un ārstēšana kaķiem.

## 5. KONTRINDIKĀCIJAS

Tā kā nav veikti šo veterināro zāļu drošības pētījumi, nelietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai kaķēniem ar ķermeņa svaru līdz 1 kg.

Nelietot slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas saslimšanas, drudzis) vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot trušiem, jo iespējamās blakusparādības un pat nāves iestāšanās.

## 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Laizīšanās gadījumā var novērot īslaicīgu hipersalivāciju (pārmērīgu siekalu izdalīšanos) galvenokārt sastāvdaļu īpašību dēļ.

Starp ļoti retām iespējamām blakusparādībām pēc lietošanas ziņots par pārejošām ādas reakcijām aplikācijas vietā (zvīņošana, vietēja alopēcija, nieze, eritēma) un vispārēju niezi vai alopēciju. Atsevišķos gadījumos pēc lietošanas novērota pastiprināta hipersalivācija, atgriezeniski neiroloģiski simptomi (paaugstināts jutīgums, depresija, nervu simptomi) vai vemšana.

Nepārdozēt!

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## 7. MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

### Lietojamais daudzums

Deva:

Vienu atsevišķo devu, kas ir 0,5 ml pipetē, jāuzklāj uz ādas starp lāpstiņām.


### Lietošanas veids

Pilināšanai uz ādas.

### Lietošanas metode

Izņemiet no trīsdalīgā maisiņa vienas devas pipeti. Turiet pipeti vertikāli, atskrūvējiet un noņemiet vāciņu. Apgrīziet vāciņu otrādi un uzlieciet otru galu atpakaļ uz pipetes. Piespiediet un pagrieziet vāciņu, lai saplēstu blīvējumu, un pēc tam noņemiet vāciņu no pipetes.

Pašķiriet dzīvnieka apmatojumu starp lāpstiņām, lai būtu redzama āda. Uzlieciet pipetes galu uz ādas un vairākas reizes saspiediet pipeti, lai tās saturu iztukšotu tieši uz ādas.



Viena deva nodrošinās aizsardzību pret blusu invāziju līdz 5 nedēļām.

Pret ērcēm zāles ir efektīvas 2 nedēļas.

Tā kā nav veikti pētījumi par zāļu drošumu, minimālais intervāls starp lietošanas reizēm ir 4 nedēļas.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Izvairīties no zāļu iekļūšanas dzīvnieku acīs.

Ir svarīgi pārliedzināties, ka zāles tiek lietotas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt, lai pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu.

Nav pieejami dati par vannošanas/mazgāšanas ar šampūnu ietekmi uz zāļu efektivitāti kaķiem. Tomēr, pamatojoties uz informāciju par efektivitāti suņiem, kas mazgāti ar šampūnu divas dienas pēc zāļu lietošanas, vannot kaķus nav ieteicams divas dienas pēc zāļu lietošanas.

Var novērot atsevišķu ērcu pieķeršanos. Tādējādi nelabvēlīgu apstākļu gadījumā nav iespējams pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnesanu. Ja ērces nav bijušas piesūkušās (sūkušas asinis), parasti tās ies bojā un no nēsātāja nokrītīs 24 - 48 stundu laikā pēc invāzijas. Pēc apstrādes nav iespējams izslēgt atsevišķu ērcu piesūkšanos. Tādēļ ieteicams kaķim jau esošās ērces noņemt apstrādes laikā, lai neļautu tām piesūkties un sūkt asinis.

Mājdzīvnieku blusas bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās, piemēram, paklājos un mēbelēs, kas masveida invāzijas gadījumā un kontroles pasākumu sākumā apstrādājamas ar piemērotu insekticīdu un regulāri jātīra ar putekļu sūcēju.

Fypryst šķīdumu pilināšanai uz ādas var lietot vaislas un grūsnām kaķenēm, kā arī laktējošām kaķenēm.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc „Derīgs līdz” vai „EXP”.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Šīs zāles var izraisīt gļotādu un acu kairinājumu.

Tādēļ jāizvairās no kontakta ar mutes gļotādu un acīm.

Cilvēkiem ar pastiprinātu jutību pret fipronilu vai spirtu vajadzētu izvairīties no kontakta ar šīm veterinārajām zālēm. Nepieļaut zāļu saskarsmi ar ādu. Ja tas ir noticis, mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi zāļu nejauša iekļūšana acīs, uzmanīgi skalot ar tīru ūdeni.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Apstrādātus dzīvniekus nedrīkst glaudīt līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi, un bērniem nedrīkst ļaut rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem. Tāpēc ieteicams dzīvniekus ārstēt nevis pa dienu, bet agri vakarā un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem.

Apstrādes laikā nesmēķēt, nedzert un neēst.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju, vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtni.

Fypryst nedrīkst nonākt ūdenstilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

## **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

01/2015

## **15. CITA INFORMĀCIJA**

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Vienā apdrukātajā kastītē ir 1, 3, 6, 10 vai 20 vienas devas pipetes ar 0,5 ml šķīduma, katra iepakota trīsdaļīgā maisiņā.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Farmakoterapeitiskā grupa: ektoparazītiski līdzekļi lokālai lietošanai.  
ATĶ vet kods: QP53AX15

Fipronils ir fenilpirazolu grupas insekticīds/akaricīds. Tas iedarbojas uz artropodiem, mijiedarbojoties ar hlorīda kanālu ligandiem, jo īpaši tiem, kurus regulē neiromediators gammaaminosviestskābe (GASS), tādējādi bloķējot hlorīdjonu pre-un postsinaptisko transportu caur šūnu membrānām.

Rezultātā insektiem un parazītiem rodas nekontrolēta centrālās nervu sistēmas aktivitāte un tie iet bojā. Fypryst šķīdums pilināšanai uz ādas satur aktīvo vielu fipronilu, kam piemīt unikāls darbības mehānisms pret blusām un ērcēm. Fypryst šķīdums pilināšanai uz ādas uzkrājas ādas un matu folikulu lipīdus saturošajās daļās un nepārtraukti izdalās no matu folikuliem uz ādas un apmatojumā, tādējādi nodrošinot ilgstošu aktivitāti.

Kopējais fipronila daudzums, kas pēc Fypryst šķīduma pilināšanai uz ādas lietošanas uzsūcas caur ādu pēc vietējas lietošanas, ir niecīgs.

Pēc Fypryst šķīduma pilināšanai uz ādas lietošanas fipronils pēc koncentrācijas gradienta mehānisma uz dzīvnieku ādas un apmatojuma izplatās no lietošanas zonas uz perifērajām zonām (gurnu zonu, cirkšņiem u.c.).

Fipronils neuzsūcas un tādējādi netiek metabolizēts organismā.

Fipronila koncentrācija apmatojumā samazinās un divus mēnešus pēc lietošanas ir 1 µg/g.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA KRKA Latvija  
Mūkusalas ielā 101  
LV-1004, Rīga  
Tel.: 67338610  
Fakss: 67338151