

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/DCP/11/0003**  
**Dehinel Plus XL tabletes suņiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
8501 Novo mesto  
Slovēnija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francija  
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Dehinel Plus XL tabletes suņiem**

*Praziquantel, pyrantel embonate, febantel*

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Katra tablete satur:

Prazikvantels	175 mg
Pirantela embonāts	504 mg
Febantels	525 mg

Ovālas, abpusēji izliektas tabletes ar nošķeltām malām un abpusēju dalījuma līniju. Viegli zaļi dzeltenā krāsā.

Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Pieaugušiem suņiem jauktu nematožu un cestozu invāziju ārstēšanai, kuras ierosina sekojošas parazītu sugas:

Nematodes

Cērmes: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (pieauguši parazīti un nenobriedušu kāpuru formas vēlā stadijā).

Āķtārpi: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (pieauguši parazīti).

Cestodes

Lenteņi: *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

Nepārsniegt noteiktās devas, lietojot grūsnām kucēm.

## 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos var novērot vemšanu ar vai bez diarejas.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā);
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 no 10000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus gadījumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## 7. MĒRĶA SUGAS

Suņi (liela un ļoti liela auguma).

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Ieteicamā deva ir 15 mg/kg ķermeņa svara (k.s.v.) febantela, 14,4 mg/kg ķ.s.v. pirantela un 5 mg/kg ķ.s.v. prazikvantela. Tas atbilst 1 tabletei uz 35 kg ķermeņa svara.

Tabletes var tikt sadalītas divās vienādās daļās.

Pirms vai pēc zāļu lietošanas pieeja barībai nav jāierobežo. Tableti(-es) var dot tieši sunim mutē vai paslēpu(-as) barībā.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai nodrošinātu pareizas devas lietošanu, pēc iespējas precīzāk jānosaka ķermeņa svars .

*Toxocara* kontrolei laktējošām kucēm vajadzētu dot 2 nedēļas pēc dzemdībām un ik pēc 2 nedēļām līdz zīdīšanas beigām.

Smagas veltņtārpu invāzijas gadījumā pēc 14 dienām deva jāatkārto.

Rutīnas veida kontrolei ieteicams lietot pa vienai devai ar trīs mēnešus ilgiem starplaikiem.

## 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Izplatīta lenteņa tipa - *Dipylidium caninum* - starpsaimnieki ir blusas. Lenteņu invāzija pilnīgi noteikti atkārtosies, ja netiks veikta starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu, apkarošana.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles nav paredzētas lietošanai suņiem, kuri vieglāki par 17,5 kg.

Neizlietotās tablešu daļas ir jāiznīcina.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personai, kura dod tabletes tieši sunim mutē vai piemaisa barībai, pēc tam jānomazgā rokas.

Ja notikusi nejauša tablešu norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Pirms grūsnu dzīvnieku ārstēšanas pret veltņtārpiem, konsultēties ar veterinārārstu.

Drīkst lietot laktācijas laikā.

Nelietot kucēm grūsnības pirmo divu trimestru laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pīrantela un piperazīna (ir daudzu suņiem paredzētu prettārpu līdzekļu sastāvā) pretparazitārā iedarbība.

Vienlaicīga lietošana ar citiem holīnerģiskiem savienojumiem var radīt toksicitāti.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Suņiem ir laba šo zāļu panesamība. Lietošanas drošuma pētījumos devas, kas 5 reizes vai vairāk pārsniedza ieteicamo devu, izraisīja gadījuma rakstura vemšanu.

## 13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

## 14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

04/2017

## 15. CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmēri:

Perforēts Al-Al blisteris: 2 tabletes (1 blisteris ar 2 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 4 tabletes (2 blisteri ar 2 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 10 tabletes (1 blisteris ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 12 tabletes (2 blisteri ar 6 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 24 tabletes (4 blisteri ar 6 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 30 tabletes (3 blisteri ar 10 tabletēm vai 5 blisteri ar 6 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 50 tabletes (5 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 60 tabletes (10 blisteri ar 6 tabletēm vai 6 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 100 tabletes (10 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 102 tabletes (17 blisteri ar 6 tabletēm) kastītē.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA KRKA Latvija  
Tel.: 67338610  
Fakss: 67338151

Bezrecepšu veterinārās zāles.

\*Tikai 60 tablešu iepakojumiem:

1 uz 35 kg

Veterinārārsta zīmogs

Dzīvnieka īpašnieka vārds: .....  
.....  
Dzīvnieka vārds: .....  
.....  
Deva: .....  
.....